

小金井市予防接種実施一覧表

種 目		接種対象年齢	標準的な接種年齢	接種方法・回数	実施期間 集団・個別	
BCG		生後1歳に至るまで	生後5月に達した時から 生後8月に達するまで	管針法による経皮1回	月2回 集団接種	
四種混合 (DPT-IPV) (ジフテリア・ 百日せき ・破傷風 ・ポリオ)	Ⅰ期	生後3月から 生後9月 (7歳6か月) に至るまで	生後3月に達した時から 生後12月に達するまで	20日以上間隔を おいて皮下3回	通年・ 個別接種	
			初回接種終了後 12月に達した時から 18月に達するまで	初回接種終了後 6月以上の間隔を おいて皮下1回	通年・ 個別接種	
二種混合④ (DT) (ジフテリア・ 破傷風)		Ⅱ期 11歳以上 13歳未満	11歳に達した時から 12歳に達するまで	皮下1回	通年・ 個別接種	
麻しん・風しん 混合 (MR) ②	Ⅰ期	生後12月から生後 24月に至るまで	左記に同じ	皮下1回	通年・ 個別接種	
	Ⅱ期	5歳以上7歳未満 で、小学校に就学す る日の1年前から就 学日の前日まで	左記に同じ	皮下1回	通年・ 個別接種	
日本脳炎 ③	Ⅰ期	生後6月から 生後9月 (7歳6か月) に至るまで	3歳に達した時から 4歳に達するまで	6日以上間隔を おいて皮下2回	通年・ 個別接種	
			4歳に達した時から 5歳に達するまで	初回接種終了後 おおむね6月以上の 間隔を おいて皮下1回	通年・ 個別接種	
		Ⅱ期	9歳以上 13歳未満	9歳に達したとき から 10歳に達するまで	9歳以上で皮下1回	
ヒブワクチン ①	初回 免疫	生後2月から 生後6月 (5歳)に至る まで	生後2月から生後7月 に至るまで	27日以上間隔を おいて皮下3回	通年・ 個別接種	
	追加 免疫		初回免疫終了後 7月から13月まで	初回免疫終了後 7月以上間隔を おいて皮下1回		
小児用 肺炎球菌 ワクチン ①	初回 免疫	生後2月から 生後6月 (5歳)に至る まで	生後2月から生後7月 に至るまで	27日以上間隔を おいて生後12月 に至る までの間に皮下3回	通年・ 個別接種	
	追加 免疫		生後12月から 生後15月 に至るまで	初回免疫終了後60日 以上間隔を おいた後で、 生後12月 に至った日 以降に皮下1回		
水痘	初回接種	生後12月から生 後3月6月 (3歳)に至る まで	生後12月から 生後15月 に至るまで	3月以上の間隔を おいて皮下2回	通年・ 個別接種	
	追加接種		初回接種終了後6月 から12月の 間隔を おいたあと			
B型肝炎ワクチン		生後1歳に至るまで	生後2月から生後9月 に至るまで	27日以上間隔を おいて皮下に2回 接種後、第 1回目の接種 から139日 以上の間隔を おいて皮下に1回	通年・ 個別接種	
子宮頸がんワクチン⑤		小学校6年生から 高校1年生相当の 女子	中学1年生の間	3回(※間隔は ワクチン によって 異なります)	通年・ 個別接種	

①ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンは、接種開始の月齢で接種回数異なります。

②麻しん・風しん混合(MR)Ⅱ期の予診票は、小学校入学1年前の4月下旬に送付いたします。

③日本脳炎Ⅱ期の予診票は、小学校4年生の4月下旬に送付いたします。

④二種混合(ジフテリア・破傷風)の予診票は、小学校6年生の4月下旬に送付いたします。

⑤子宮頸がんワクチンは、現在勧奨が差し控えられています。(※定期接種として接種することは可能です)